

PROCESSIONARIA DEL PINO - SCHEDA TECNICA DI DIFESA INTEGRATA

Metodi di Lotta	Sostanza Attiva	Periodo di intervento	Note
1. Fisico-meccanici (asportazione dei nidi, lotta balistica)		tardo autunno – inizio dell’inverno (prima dell’apertura dei nidi invernali)	<ul style="list-style-type: none"> • Rimozione dei nidi nella stagione invernale prima che l’innalzamento termico faccia uscire le larve. • Per piante isolate è proponibile l’applicazione di cartoni collati intorno al tronco, in febbraio-marzo, al fine di catturare le larve che scendono dalla chioma. • Lotta balistica, effettuata sparando contro i nidi invernali, ha un’efficacia ridotta rispetto all’asportazione dei nidi
2. Biotecnici (trappole a feromoni)		entro la prima decade di giugno	<ul style="list-style-type: none"> • In zone isolate, predisporre trappole a feromoni per la cattura massale lungo il perimetro ad una distanza di circa 100 mt. l’una dall’altra.
3. Irrorazioni in piena chioma con prodotti biologici	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki o var. Aizawai	nel mese di settembre	<ul style="list-style-type: none"> • Bagnare bene ed uniformemente la chioma intervenendo nelle ore serali più fresche. • In caso di pioggia o di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 4-5 gg.
4. Iniezioni al tronco (endoterapia)	abamectina	seconda metà di agosto - settembre	<ul style="list-style-type: none"> • Seguire le indicazioni relative alla tecnica endoterapica scelta