



SUSINO FORMICHINE

N° **REPERTORIO: 126**
inserita il 19.12.2019

FAMIGLIA: **Rosacee**

GENERE: **Prunus**

SPECIE: **domestica**

NOME COMUNE: **Formichine**

RISCHIO DI EROSIONE:

Alto

AREA AUTOCTONA
DI DIFFUSIONE:

Comune di Colli al Metauro - PU

LUOGO DI
CONSERVAZIONE e/o
RIPRODUZIONE:

**Società Agricola
Fratelli Boni s.s.
Via Traversa Sacca 4
Colli al Metauro (PU)**

CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE

L'area di origine corrisponde al comune di Colli al Metauro dove è ubicata l'azienda agricola dei Fratelli Boni.

Questa varietà viene coltivata dalla famiglia Boni almeno da 5 generazioni per cui si arriva a ritroso nel tempo con certezza alla fine del 1800, tale varietà veniva utilizzata insieme alla pesca SLAPI ed al pero come intermezzo nei filari di vite maritata con acero nella tipica coltivazione dei filari alberati utilizzata nelle campagne delle Marche.

I filari erano distanti 12 metri gli uni dagli altri, gli aceri lungo la fila con distanza di impianto a 12 metri intermezzati con un albero da frutta, le viti completavano il filare. L'interfila veniva utilizzata per le coltivazioni erbacee ed orticole dell'azienda.

Attualmente tale varietà è diffusa solo nel comune di Colli al Metauro

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

ALBERO

di media-scarso vigoria, portamento globoso-espanso, chioma folta ben sviluppata. Fruttificazione prevalente su rami misti, brindilli e dardi. Pianta rustica con ampia adattabilità pedoclimatica.

FOGLIA

è di medie dimensioni, forma obovata di colore verde

scuro nella pagina superiore, più chiaro nella pagina inferiore, con margine crenato e di medio-elevato spessore.

FIORI

di dimensioni medie o medio-piccole, presentano dei petali bianchi di forma ellittico-allungata. L'epoca di fioritura è intermedia, di elevata entità, autocompatibile.

FRUTTO

La forma del frutto è ovata

o ovato-allungata, di piccole dimensioni, colore della buccia violetto purpureo a completa maturazione e presenza di pruina sulla superficie.

CARATTERI DELLA POLPA

La polpa del frutto è verde-giallastra. La consistenza della polpa a completa maturazione è medio scarsa, succosa, di ottimo sapore. L'endocarpo è di piccole dimensioni è di forma ellittica leggermente schiacciato e colore marrone.

FENOLOGIA

L'epoca di germogliamento e di fioritura sono intemedie (epoca Stanley). L'epoca di maturazione è precoce, il frutto matura generalmente tra la prima e la seconda decade di Luglio. La maturazione è scalare, necessita di più stacchi per uniformare la qualità della produzione.

PRODUTTIVITÀ

Generalmente la pianta è molto produttiva e di solito non viene diradata. L'utilizzo è per il consumo fresco ma anche per il trasformato (confetture).

SUSCETTIBILITÀ O RESISTENZA A FITOPATIE

Non si evidenziano particolari suscettibilità alle malattie.



Scheda elaborata da:

**Franco Capocasa - UNIVPM - D3A - area scientifica di Frutticoltura
Gianni Malavolta - A.S.S.A.M.**

Azienda coltivatrice: **Azienda Società Agricola Fratelli Boni s.s. - Colli al Metauro (PU)**